

**Anexo 1. Cuestionario de tabaquismo**

**Sección 1: Demográfico**

¿Cuál es su género? 1. Femenino 2. Masculino  
 ¿Cuál es su edad? Edad \_\_\_\_\_

**Sección 2: Uso de cigarrillo**

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su conducta de fumar? **Marque con una X y vaya a la pregunta que se indica.**

- 1. Nunca he fumado cigarrillos  Ir a pregunta 12
- 2. No he fumado cigarrillos en los últimos 6 meses  Ir a pregunta 9
- 3. Actualmente fumo menos de un cigarro diario  Ir a pregunta 5
- 4. Actualmente fumo al menos un cigarro al día  Ir a pregunta 5

**Si actualmente fuma**

¿Qué edad tenía cuando empezó a fumar de forma regular? Edad \_\_\_\_\_  
 ¿Cuántos cigarrillos fuma semanalmente? Promedio \_\_\_\_\_  
 ¿Alguna vez ha dejado de fumar durante al menos una semana? 1. Sí 2. No

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor cómo se siente con respecto a la conducta fumadora?

- 1. No está listo para dejar de fumar en los próximos 6 meses Ir a pregunta 12
- 2. Tiene pensado dejar de fumar en los próximos 6 meses Ir a pregunta 12
- 3. Esta Listo para dejar de fumar ahora Ir a pregunta 12

**Si usted ha fumado en el pasado**

¿Con que frecuencia usted fumó en el pasado?  
 1. Diariamente 2. Menos de un cigarro diario  
 ¿Qué edad tenía cuando empezó a fumar de forma regular? Edad \_\_\_\_\_  
 ¿Qué edad tenía cuando dejó de fumar por completo? Edad \_\_\_\_\_

**Sección 3: Conocimiento y actitudes**

Marque la casilla adecuada	Muy de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo
1. Fumar es perjudicial para la salud.					
2. Los profesionales de la salud sirven como modelo para sus pacientes y el público.					
3. Los profesionales deben dar un buen ejemplo, por lo tanto, no deben fumar.					
4. Las probabilidades de dejar de fumar de un paciente aumentan, si este es aconsejado por un profesional de área de salud.					
5. Los profesionales de la salud deben preguntar de forma rutinaria a sus pacientes sobre su conducta fumadora.					
6. Los profesionales deben aconsejar de forma rutinaria a sus pacientes fumadores a dejar de fumar.					
7. En relación a los profesionales que fuman, es menos probable que inciten a la población a dejar de fumar.					
8. Los profesionales de salud deben recibir formación específica sobre técnicas que promuevan el cese del tabaquismo.					
9. Los profesionales de salud deben hablar con grupos de la comunidad sobre el tabaquismo.					
10. Debe prohibirse fumar en lugares públicos cerrados.					
11. Las advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos deben estar en letras grandes y visibles.					
La venta de tabaco a niños y adolescentes deben ser prohibidos.					
12. Patrocinios deportivos por la industria del tabaco deben ser prohibidos.					
Debe haber una prohibición completa de la publicidad de los productos del tabaco.					
13. Los hospitales y centros de salud deben ser “libres de humo”.					
14. El precio de los productos del tabaco debe aumentar drásticamente.					
15. La muerte neonatal se asocia con el tabaquismo pasivo.					
16. El tabaquismo materno durante el embarazo aumenta el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante.					
17. El tabaquismo pasivo aumenta el riesgo de enfermedad pulmonar en adultos no fumadores.					
18. El tabaquismo pasivo aumenta el riesgo de enfermedades del corazón en adultos no fumadores.					
19. El fumar de los padres aumenta el riesgo de enfermedades de las vías respiratorias como la neumonía en los niños expuestos.					
20. Profesionales deben aconsejar a los pacientes que fuman de forma rutinaria indicando evitar fumar cerca de los niños.					